Vigoro UltraTurf™

Pre-Emergent

Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4

Control de Hierbas Silvestres

Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4

TREATS 5,000 SQ FT

para tratar 5,000 pies cuadrados

FPO UPC

0 13013 22322 9

Non-Staining

No Mancha

Vigoro®

UltraTurf™

Pre-Emergent Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4

Control de Hierbas Silvestres Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4

up to 4 Months of Crabgrass & Weed Control!

¡Hasta 4 Meses de Control de Hierbas Silvestres y Malezas!

- ***PRE- & EARLY* Post-Emergence Control of Crabgrass**
  Control de Hierbas Silvestres ANTES y AL INICIO de la Germinación
- **Greens in 72 Hours!**
  ¡Proporciona Color Verde en 72 Horas!
- **Timed-Release Nitrogen for Extended Feeding!**
  ¡Nitrógeno de Liberación Programada para Nutrición Extendida!

For Outdoor Residential Use Only.
Para Utilizar en Exteriores Residenciales Solamente.

Active Ingredient:

Dithiopyr*	0.17%
Other Ingredients	99.83%
TOTAL	100.00%

*CAS # 97886-45-8

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION
See back panel for additional precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN
Consulte el panel posterior para ver declaraciones de precaución adicionales.

Net Wt 17 lb (7.7 kg)

TREATS 5,000 SQ FT
TRATA 5,000 pies cuadrados

EARLY SPRING OR FALL APPLICATION
SE APLICA A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA O EN EL OTOÑO

TREATS 5,000 SQ FT
para tratar 5,000 pies cuadrados

FPO UPC
0 13013 22322 9

Vigoro® UltraTurf™

Pre-Emergent Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4

Control de Hierbas Silvestres

Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4

English

STOP **READ THIS ENTIRE LABEL BEFORE USE.**

PROJECT GUIDE

For a thicker, greener, more beautiful lawn, follow ***Vigoro's Annual Lawn Care Program***. It's easy to follow and can be started at anytime by simply applying the product that corresponds with the current season!

SPRING ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ FALL ▸ ▸ ▸

Early Spring	*Late Spring*	*Summer*	*Early Fall*	*Late Fall*
CRABGRASS PREVENTER	WEED & FEED	LAWN INSECT CONTROL	LAWN FERTILIZER	WINTERIZER

Vigoro offers complete annual lawn care programs for all areas. See your local store associate or visit ***Vigoro.com*** for more information about a customized program that is right for your area and turf type.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. *For outdoor residential use only.*

IMPORTANT: Follow label directions.

General use directions

1. Determine size of area to be treated – measure length and width in feet, then multiply to determine coverage area in sq ft (length x width). ***Next, subtract non-lawn areas.***
2. Use the spreader setting chart to determine appropriate setting.
3. Treat as directed – thorough coverage is important. Be sure to water in after application.
4. Keep children and pets off treated areas until this material is washed into turf and grass is dry.
5. Do not use food utensils such as spoons or measuring cups for food purposes after use in measuring pesticides.

Using these directions

These "Directions for Use" are designed to help you determine the appropriate application procedure for this product. Before using this product, make sure that you read the entire "Directions for Use" section of this label.

Before you use

Read and follow these guidelines when you use this product:

- Apply only to lawns and ornamental turf that are well established.
- Wait at least 12 weeks after using this product before reseeding, overseeding, or sprigging of grass into areas that have been treated.
- An increased chance of injury to grass may occur if product is used on new lawns or grass that has been weakened or stressed by drought, excessive temperatures or pests.
- When applying around ponds or other bodies of water, do not apply in windy conditions or where product can run off into water.
- Do not use grass clippings as mulch around vegetables or fruit trees.
- **Do not make more than 1 application to the same area in the same year.**

WHERE TO USE

This product can be used on the following types of grass when applied as directed:

Cool Season Grasses			**Warm Season Grasses**			
Bentgrass (creeping)	Fescue fine	Ryegrass (perennial)	Bahia	Buffalograss	Centipede	Kikuyugrass
Bluegrass (Kentucky)	Fescue tall		Bermuda	Carpetgrass	St. Augustine	Zoysiagrass

WHEN TO APPLY



- Product may be applied either in spring or fall for the control of weeds.
- Product will provide up to 4 months of weed control when used as directed, although length of control can be affected by weather, grass conditions and weed pressures.
- To get control of listed weeds other than crabgrass, applications must be made before weeds emerge.
- Vigoro® Ultra Turf™ Pre-Emergent Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4 will control crabgrass if applied before it emerges and up to 4 weeks after it emerges.

Weeds Controlled

Pre- and Early Post-Emergent: Crabgrass

Pre-Emergent (Preventative):

Grass Weeds: Annual Bluegrass, Annual Ryegrass, Barnyardgrass, Crabgrass, Crowfootgrass, Goosegrass, Green Foxtail, Kikuyugrass (seedling), Perennial Ryegrass, Smutgrass (seedling), Yellow Foxtail

Broadleaf Weeds: Bittercress, Buttercup Oxalis, Carolina Geranium, Chickweed, Common Lespedeza, Common Purslane, Corn Speedwell, Creeping Oxalis, Henbit, Parsley-piert, Pineappleweed, Prostrate Spurge, Spotted Spurge, Yellow Woodsorrel

Always use a fertilizer spreader. See spreader settings chart for spreader setting rates.
Water thoroughly after application.

HOW TO APPLY

1. Apply this product at the rate of: 3.4 lb per 1,000 sq ft (1 bag treats 5,000 sq ft).
2. Calibrate your spreader according to the spreader manufacturer's directions. Adjust settings as needed to apply the recommended rate of product.

3. Using a drop-type or rotary spreader, apply granules evenly over grass, avoiding streaking, skips or overlaps. Avoid using spreaders that apply product in narrow or concentrated bands.
4. Check calibration of spreader frequently to ensure spreader is functioning properly and applying product evenly.

IMPORTANT: It is important to follow directions as indicated on this quality lawn care product as over-application may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed at which applied, and roughness of area treated. Be sure to calibrate spreader before beginning, adjusting if necessary. Consult Owners' Manual.

NEVER APPLY BY HAND.

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn.

SPREADER SETTINGS:
AJUSTES DEL ESPARCIDOR:

ROTARY SPREADERS	*ESPARCIDORES ROTATIVOS*
EARTHWAY 2050	12
SCOTTS SPEEDYGREEN 1000	7 1/4
SCOTTS SPEEDYGREEN 2000	7
SCOTTS SPEEDYGREEN 3000	7
VIGORO 4300	6
VIGORO 10,000	4
VIGORO 15,000	4
DROP SPREADERS	***ESPARCIDORES POR GOTEO***
SCOTTS ACCUGREEN 1000	6 3/4
SCOTTS ACCUGREEN 2000	7 1/2
SCOTTS ACCUGREEN 3000	8

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store product in original container in a cool, dry, locked place out of reach of children and pets.
Disposal: If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes eye irritation, if in eyes. Harmful if inhaled. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. If product gets on clothes, wash before reuse. Prolonged or repeated skin contact may cause allergic skin reactions in some individuals.

First Aid

This table below describes the first aid procedures for incidents involving this product.

In the case of accidental . . .	Immediately . . .
Contact with eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
Inhalation of dust	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a Poison Control Center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Environmental Hazards

- This product is toxic to fish and highly toxic to other aquatic organisms including oysters and shrimp. Use with care when applying to turf areas adjacent to any body of water. Drift and runoff from treated turf may adversely affect aquatic organisms in adjacent aquatic sites. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas.
- Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment washwater.

GUARANTEED ANALYSIS: **30-3-4**

Total Nitrogen (N) 30%
1.17% Ammoniacal Nitrogen
28.83% Urea Nitrogen*
Available Phosphate (P_2O_5) 3%
Soluble Potash (K_2O) 4%

Derived from: Polymer-coated Urea, Polymer-coated Sulfur-coated Urea, Urea, Diammonium Phosphate and Muriate of Potash.

*Contains 6.0% slowly available urea nitrogen from coated urea.

Distributed and guaranteed by Spectrum Group **F1074**
Division of United Industries Corporation, PO Box 142642
St. Louis, MO 63114-0642 11-7473 ©2005 UIC

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

If you use Vigoro Ultra Turf Pre-Emergent Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4 as directed and are not completely satisfied, send proof of purchase from this package and the original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.

Ultra Turf® is a registered trademark of Martin Resources, Inc. and is used under license.

When applied as directed, this product meets the guidelines for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at **http://www.regulatory-info-sb.com.**

EPA Reg. No. 8860-154-8845
EPA Est. Nos. 9198-OH-1 (M), 9198-OH-2 (B), 9198-AL-1 (A), 49991-TX-1 (AZ), 49991-TX-2 (BC), 45065-MN-1 (BD), 59144-GA-1 (BE), 6665-NY-1 (BP), 35512-FL-2 (BG), 8378-IN-1 (AS), 43854-MO-1 (BH), 49710-TX-1 (AT), 49710-TX-3 (AU), 3234-UT-1 (AV), 3234-AZ-1 (AW), 8660-AL-1 (BN), 8660-OH-1 (BO), 74764-CA-1 (BK), 74764-FL-1 (BL), 9404-FL-1 (AX), 35497-OR-1 (AY)
Circled letter is first letter of lot number.

Visit Us On The Internet
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visítenos en Internet
Para Información en Español

vigoro.com or 1-800-561-1333

0 13013 22322 9

Español

ALTO **LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USARLO.**

GUÍA DEL PROYECTO

Para obtener un césped más espeso, más verde y más hermoso, siga el ***Programa de Cuidados de Césped Anual de Vigoro***. ¡Es fácil de seguir y puede comenzar en cualquier momento simplemente aplicando el producto que corresponde a la temporada actual!

PRIMAVERA ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ OTOÑO ▸ ▸ ▸

Principios de la Primavera	*Fines de la Primavera*	*Verano*	*Principios de Otoño*	*Fines de Otoño*
INHIBIDOR DE HIERBAS SILVESTRES	HERBICIDA Y FERTILIZANTE	CONTROL DE INSECTOS DEL CÉSPED	FERTILIZANTE PARA CÉSPED	WINTERIZER

Vigoro ofrece programas anuales completos de cuidado del césped para todas las áreas. Consulte a un asociado de su tienda local o visite ***Vigoro.com*** para obtener más información acerca de algún programa personalizado que sea adecuado para su área y tipo de césped.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de forma diferente a lo indicado en su etiqueta constituye una violación de la ley Federal. *Sólo para uso exterior y residencial.*
IMPORTANTE: Siga las instrucciones de la etiqueta.

Instrucciones generales de uso

1. Determine el tamaño de la superficie a tratar – mida el largo y el ancho en pies, luego multiplíquelos para determinar la superficie de cobertura en pies cuadrados (largo x ancho). ***Luego reste las superficies sin césped.***
2. Utilice la tabla de ajustes del esparcidor para determinar el ajuste adecuado.
3. Trate como se indica – es importante cubrir por completo. Riegue como se indica en la etiqueta.
4. Mantenga los niños y las mascotas alejados de las áreas tratadas hasta que este material se absorba en el césped y hasta que el césped se seque.
5. No utilice utensilios de cocina como cucharas o tazas medidoras para manejar alimentos después de usarlos para medir pesticidas.

Utilización de estas instrucciones

Estas "Instrucciones de Uso" están diseñadas para ayudarlo a determinar cuál es el procedimiento de aplicación adecuado para este producto. Antes de usar este producto, asegúrese de leer toda la sección "Instrucciones de Uso" de esta etiqueta.

Antes de usar

Lea y siga estas pautas cuando use este producto:

- Aplique sólo en césped y césped decorativo bien consolidado.
- Espere al menos 12 semanas después de usar este producto para resembrar, sembrar encima o cubrir con plantas jóvenes de césped en las áreas que se han tratado.
- El uso del producto en césped nuevo o césped que ha sido debilitado o ha sido sometido a tensión por sequía, temperaturas excesivas o plagas aumenta las probabilidades de dañar el césped.
- Cuando lo aplique en alrededores de estanques y otras masas de agua, no lo haga en condiciones ventosas o donde el producto pueda caer al agua.
- No utilice césped cortado como cubresuelo alrededor de hortalizas y árboles frutales.
- **No realice más de 1 aplicación en la misma área el mismo año.**

DÓNDE UTILIZARLO

Este producto puede usarse en los siguientes tipos de césped cuando se aplica según las instrucciones:

Césped de Temporada Fría			**Césped de Temporada Cálida**			
Agrostis (rastrero)	Festuca fina	Ballico (perenne)	Bahía	Césped Búfalo	Ciempiés	Kikuyo
Poa de los Prados (Kentucky)		Festuca alta	Bermuda	Carpetgrass	San Agustín Césped	Zoysia

CUÁNDO APLICAR

- El producto puede aplicarse en primavera o en otoño para el control de malezas.
- El producto proporcionará hasta 4 meses de control de malezas cuando se use según las instrucciones, aunque la duración del control puede estar afectada por el clima, las condiciones del césped y las presiones de malezas.
- Para lograr el control de las malezas enumeradas excepto las hierbas silvestres, las aplicaciones deben realizarse antes de que las malezas germinen.
- El Control de Hierbas Silvestres Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4 Ultra Turf™ de Vigoro ® controlará las hierbas silvestres si se aplica antes de que germinen y hasta 4 semanas después de su germinación.

Malezas Controladas

Antes y al Inicio de la Germinación: Hierbas Silvestres

Antes de la Germinación (Preventivo):

Malezas del Césped: Poa Anual, Ballico Anual, Mijo Japonés, Hierba Silvestre, Yerba Egipcia, Pata de Gallina, Cola de Zorro Verde, Kikuyo (primeros brotes), Ballico Perenne, Cerrillo (primeros brotes), Cola de Zorro Amarilla

Malezas de Hoja Ancha: Mastuerzo, Vinagrillo, Geranio de Carolina, Pamplina, Lespedeza Común, Verdolaga Común, Verónica, Oxalis Rastrera, Ortiga Mansa, Alquimila Arvense, Matricaria, Celidonia, Lechetrezna Manchada, Woodsorrel Amarillo

Use siempre un esparcidor de fertilizante. Consulte la tabla de ajustes del esparcidor para ver las proporciones de los ajustes del esparcidor. **Riegue con abundante agua después de la aplicación.**

CÓMO APLICAR

1. Aplique este producto en la proporción: 3.4 lb por 1,000 pies cuadrados (1 bolsa trata 5,000 pies cuadrados).
2. Calibre el esparcidor de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Haga los ajustes necesarios para aplicar la proporción de producto recomendada.

3. Usando un esparcidor por goteo o rotativo, aplique gránulos de forma pareja sobre el césped, evitando excesos, superposiciones y zonas sin aplicar. Evite usar esparcidores que aplican el producto en bandas estrechas o concentradas.
4. Compruebe la calibración del esparcidor con frecuencia para asegurarse de que funcione correctamente y aplique el producto de forma pareja.

IMPORTANTE: Es importante seguir las instrucciones indicadas en este producto de calidad para el cuidado del césped, ya que una aplicación excesiva puede dañarlo.

Los ajustes del esparcidor son aproximados. Las diferencias pueden darse debido a la condición del esparcidor, la velocidad a la que se aplica el producto y la rugosidad de la superficie tratada. Asegúrese de calibrar el esparcidor antes de comenzar y ajústelo si es necesario. Consulte el Manual del Propietario.

NUNCA APLIQUE CON LA MANO.

Para evitar que queden huecos o excesos de aplicación, comience desde el borde del terreno y luego continúe hacia el centro con pasadas paralelas uniformes. Camine a un ritmo estable de modo que aplique el producto uniformemente sobre el césped.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Almacene el producto en el contenedor original en un lugar fresco, seco y cerrado fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Eliminación: Si está vacío: No vuelva a utilizar este envase. Colóquelo en un basurero u ofrézcalo para reciclaje si el servicio está disponible. **Si está lleno en parte:** Llame a la agencia de desechos sólidos de su zona o llame al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones acerca de cómo eliminar dichos desechos. Nunca coloque el producto que no se utilizó en un drenaje interior o exterior.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Peligros para Humanos y Animales Domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación ocular si penetra en los ojos. Peligroso si se inhala. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de su manipulación. Si el producto entra en contacto con la ropa, lávela antes de volver a usarla. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en la piel de algunas personas.

Primeros Auxilios

La tabla siguiente describe los procedimientos de primeros auxilios para incidentes que involucran a este producto.

En el caso de que accidentalmente se produzca...	Inmediatamente . . .
Contacto con los ojos	• Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto (si es que usa) después de los primeros 5 minutos, luego siga enjuagando los ojos. • Llame a un Centro de Toxicología o a un médico para que le prescriba un tratamiento.
Inhalación del polvo	• Lleve a la persona al aire fresco. • Si la persona no puede respirar, llame al 911 o a una ambulancia y luego, proporciónele respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. • Llame a un Centro de Toxicología o a un médico para que le prescriba un tratamiento adicional.

Tenga a mano el contenedor o la etiqueta del producto cuando llame al Centro de Toxicología o al médico, o busque tratamiento.

Peligros Ambientales

- Este producto es tóxico para los peces y altamente tóxico para otros organismos acuáticos como ostras y camarones. Úselo con cuidado al aplicar en áreas con césped adyacentes a cualquier masa de agua. La deriva o el desplazamiento pueden afectar en forma adversa a los organismos de sitios acuáticos adyacentes. No lo aplique directamente al agua o en áreas donde haya superficies de agua o en áreas entre mareas debajo de la marca máxima promedio. No lo aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan la deriva del área tratada.
- No contamine el agua cuando limpie el equipo o cuando elimine el agua usada para la limpieza de los equipos.

Non-Staining
No Mancha

FPO UPC
0 13013 22322 9

TREATS 5,000 SQ FT
para tratar 5,000 pies cuadrados

Vigoro®
UltraTurf™

Pre-Emergent Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4

Control de Hierbas Silvestres

Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4

Vigoro® UltraTurf™
Pre-Emergent Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4
Control de Hierbas Silvestres
Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4

Pre-Emergent
Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4
Control de Hierbas Silvestres
Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4

up to 4 Months of Crabgrass & Weed Control!

¡Hasta 4 Meses de Control de Hierbas Silvestres y Malezas!

- ***PRE- & EARLY* Post-Emergence Control of Crabgrass**
  Control de Hierbas Silvestres ANTES y AL INICIO de la Germinación
- **Greens in 72 Hours!**
  ¡Proporciona Color Verde en 72 Horas!
- **Timed-Release Nitrogen for Extended Feeding!**
  ¡Nitrógeno de Liberación Programada para Nutrición Extendida!

TREATS 5,000 SQ FT
para tratar 5,000 pies cuadrados

For Outdoor Residential Use Only.
Para Utilizar en Exteriores Residenciales Solamente.

Active Ingredient:

Dithiopyr*	0.17%
Other Ingredients	99.83%
TOTAL	100.00%

*CAS # 97886-45-8

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION
See back panel for additional precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN
Consulte el panel posterior para ver declaraciones de precaución adicionales.

Net Wt 17 lb (7.7 kg)

TREATS 5,000 SQ FT
TRATA 5,000 pies cuadrados

EARLY SPRING OR FALL APPLICATION
SE APLICA A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA O EN EL OTOÑO

FPO UPC
0 13013 22322 9

Vigoro® UltraTurf™

Pre-Emergent
Crabgrass Control
plus Fertilizer 30-3-4
Control de Hierbas Silvestres
Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4

English

STOP **READ THIS ENTIRE LABEL BEFORE USE.**

PROJECT GUIDE

For a thicker, greener, more beautiful lawn, follow ***Vigoro's Annual Lawn Care Program***. It's easy to follow and can be started at anytime by simply applying the product that corresponds with the current season!

SPRING ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ FALL ▸ ▸ ▸

Early Spring	*Late Spring*	*Summer*	*Early Fall*	*Late Fall*
CRABGRASS PREVENTER	WEED & FEED	LAWN INSECT CONTROL	LAWN FERTILIZER	WINTERIZER

Vigoro offers complete annual lawn care programs for all areas. See your local store associate or visit ***Vigoro.com*** for more information about a customized program that is right for your area and turf type.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. *For outdoor residential use only.*

IMPORTANT: Follow label directions.

General use directions

1. Determine size of area to be treated – measure length and width in feet, then multiply to determine coverage area in sq ft (length x width). ***Next, subtract non-lawn areas.***
2. Use the spreader setting chart to determine appropriate setting.
3. Treat as directed – thorough coverage is important. Be sure to water in after application.
4. Keep children and pets off treated areas until this material is washed into turf and grass is dry.
5. Do not use food utensils such as spoons or measuring cups for food purposes after use in measuring pesticides.

Using these directions

These "Directions for Use" are designed to help you determine the appropriate application procedure for this product. Before using this product, make sure that you read the entire "Directions for Use" section of this label.

Before you use

Read and follow these guidelines when you use this product:

- Apply only to lawns and ornamental turf that are well established.
- Wait at least 12 weeks after using this product before reseeding, overseeding, or sprigging of grass into areas that have been treated.
- An increased chance of injury to grass may occur if product is used on new lawns or grass that has been weakened or stressed by drought, excessive temperatures or pests.
- When applying around ponds or other bodies of water, do not apply in windy conditions or where product can run off into water.
- Do not use grass clippings as mulch around vegetables or fruit trees.
- **Do not make more than 1 application to the same area in the same year.**

WHERE TO USE

This product can be used on the following types of grass when applied as directed:

Cool Season Grasses			**Warm Season Grasses**			
Bentgrass (creeping)	Fescue fine	Ryegrass (perennial)	Bahia	Buffalograss	Centipede	Kikuyugrass
Bluegrass (Kentucky)	Fescue tall		Bermuda	Carpetgrass	St. Augustine	Zoysiagrass

WHEN TO APPLY

- Product may be applied either in spring or fall for the control of weeds.
- Product will provide up to 4 months of weed control when used as directed, although length of control can be affected by weather, grass conditions and weed pressures.
- To get control of listed weeds other than crabgrass, applications must be made before weeds emerge.
- Vigoro® Ultra Turf™ Pre-Emergent Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4 will control crabgrass if applied before it emerges and up to 4 weeks after it emerges.

Weeds Controlled

Pre- and Early Post-Emergent: Crabgrass

Pre-Emergent (Preventative):

Grass Weeds: Annual Bluegrass, Annual Ryegrass, Barnyardgrass, Crabgrass, Crowfootgrass, Goosegrass, Green Foxtail, Kikuyugrass (seedling), Perennial Ryegrass, Smutgrass (seedling), Yellow Foxtail

Broadleaf Weeds: Bittercress, Buttercup Oxalis, Carolina Geranium, Chickweed, Common Lespedeza, Common Purslane, Corn

Español

ALTO **LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USARLO.**

GUÍA DEL PROYECTO

Para obtener un césped más espeso, más verde y más hermoso, siga el ***Programa de Cuidados de Césped Anual de Vigoro***. ¡Es fácil de seguir y puede comenzar en cualquier momento simplemente aplicando el producto que corresponde a la temporada actual!

PRIMAVERA ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ OTOÑO ▸ ▸ ▸

Principios de la Primavera	*Fines de la Primavera*	*Verano*	*Principios de Otoño*	*Fines de Otoño*
INHIBIDOR DE HIERBAS SILVESTRES	HERBICIDA Y FERTILIZANTE	CONTROL DE INSECTOS DEL CÉSPED	FERTILIZANTE PARA CÉSPED	WINTERIZER

Vigoro ofrece programas anuales completos de cuidado del césped para todas las áreas. Consulte a un asociado de su tienda local o visite ***Vigoro.com*** para obtener más información acerca de algún programa personalizado que sea adecuado para su área y tipo de césped.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de forma diferente a lo indicado en su etiqueta constituye una violación de la ley Federal. *Sólo para uso exterior y residencial.*

IMPORTANTE: Siga las instrucciones de la etiqueta.

Instrucciones generales de uso

1. Determine el tamaño de la superficie a tratar – mida el largo y el ancho en pies, luego multiplíquelos para determinar la superficie de cobertura en pies cuadrados (largo x ancho). ***Luego reste las superficies sin césped.***
2. Utilice la tabla de ajustes del esparcidor para determinar el ajuste adecuado.
3. Trate como se indica – es importante cubrir por completo. Riegue como se indica en la etiqueta.
4. Mantenga los niños y las mascotas alejados de las áreas tratadas hasta que este material se absorba en el césped y hasta que el césped se seque.
5. No utilice utensilios de cocina como cucharas o tazas medidoras para manejar alimentos después de usarlos para medir pesticidas.

Utilización de estas instrucciones

Estas "Instrucciones de Uso" están diseñadas para ayudarlo a determinar cuál es el procedimiento de aplicación adecuado para este producto. Antes de usar este producto, asegúrese de leer toda la sección "Instrucciones de Uso" de esta etiqueta.

Antes de usar

Lea y siga estas pautas cuando use este producto:

- Aplique sólo en césped y césped decorativo bien consolidado.
- Espere al menos 12 semanas después de usar este producto para resembrar, sembrar encima o cubrir con plantas jóvenes de césped en las áreas que se han tratado.
- El uso del producto en césped nuevo o césped que ha sido debilitado o ha sido sometido a tensión por sequía, temperaturas excesivas o plagas aumenta las probabilidades de dañar el césped.
- Cuando lo aplique en alrededores de estanques y otras masas de agua, no lo haga en condiciones ventosas o donde el producto pueda caer al agua.
- No utilice césped cortado como cubresuelo alrededor de hortalizas y árboles frutales.
- **No realice más de 1 aplicación en la misma área el mismo año.**

DÓNDE UTILIZARLO

Este producto puede usarse en los siguientes tipos de césped cuando se aplica según las instrucciones:

Césped de Temporada Fría			**Césped de Temporada Cálida**			
Agrostis (rastrero)	Festuca fina	Ballico (perenne)	Bahía	Césped Búfalo	Ciempiés	Kikuyo
Poa de los Prados (Kentucky)		Festuca alta	Bermuda	Carpetgrass	San Agustín Césped	Zoysia

CUÁNDO APLICAR

- El producto puede aplicarse en primavera o en otoño para el control de malezas.
- El producto proporcionará hasta 4 meses de control de malezas cuando se use según las instrucciones, aunque la duración del control puede estar afectada por el clima, las condiciones del césped y las presiones de malezas.
- Para lograr el control de las malezas enumeradas excepto las hierbas silvestres, las aplicaciones deben realizarse antes de que las malezas germinen.
- El Control de Hierbas Silvestres Antes de la Germinación con Fertilizante 30-3-4 Ultra Turf™ de Vigoro® controlará las hierbas silvestres si se aplica antes de que germinen y hasta 4 semanas después de su germinación.

Malezas Controladas

Antes y al Inicio de la Germinación: Hierbas Silvestres

Antes de la Germinación (Preventivo):

Malezas del Césped: Poa Anual, Ballico Anual, Mijo Japonés, Hierba Silvestre, Yerba Egipcia, Pata de Gallina, Cola de Zorro Verde, Kikuyo (primeros brotes), Ballico Perenne, Cerrillo (primeros brotes), Cola de Zorro Amarilla

Malezas de Hoja Ancha: Mastuerzo, Vinagrillo, Geranio de Carolina, Pamplina, Lespedeza Común, Verdolaga Común, Verónica, Oxalis Rastrera, Ortiga

Weeds Controlled

Pre- and Early Post-Emergent: Crabgrass

Pre-Emergent (Preventative):

Grass Weeds: Annual Bluegrass, Annual Ryegrass, Barnyardgrass, Crabgrass, Crowfootgrass, Goosegrass, Green Foxtail, Kikuyugrass (seedling), Perennial Ryegrass, Smutgrass (seedling), Yellow Foxtail

Broadleaf Weeds: Bittercress, Buttercup Oxalis, Carolina Geranium, Chickweed, Common Lespedeza, Common Purslane, Corn Speedwell, Creeping Oxalis, Henbit, Parsley-piert, Pineappleweed, Prostrate Spurge, Spotted Spurge, Yellow Woodsorrel

Malezas Controladas

Antes y al Inicio de la Germinación: Hierbas Silvestres

Antes de la Germinación (Preventivo):

Malezas del Césped: Poa Anual, Ballico Anual, Mijo Japonés, Hierba Silvestre, Yerba Egipcia, Pata de Gallina, Cola de Zorro Verde, Kikuyo (primeros brotes), Ballico Perenne, Cerrillo (primeros brotes), Cola de Zorro Amarilla

Malezas de Hoja Ancha: Mastuerzo, Vinagrillo, Geranio de Carolina, Pamplina, Lespedeza Común, Verdolaga Común, Verónica, Oxalis Rastrera, Ortiga Mansa, Alquimila Arvense, Matricaria, Celidonia, Lechetrezna Manchada, Woodsorrel Amarillo

Always use a fertilizer spreader. See spreader settings chart for spreader setting rates.
Water thoroughly after application.

HOW TO APPLY

1. Apply this product at the rate of: 3.4 lb per 1,000 sq ft (1 bag treats 5,000 sq ft).
2. Calibrate your spreader according to the spreader manufacturer's directions. Adjust settings as needed to apply the recommended rate of product.

3. Using a drop-type or rotary spreader, apply granules evenly over grass, avoiding streaking, skips or overlaps. Avoid using spreaders that apply product in narrow or concentrated bands.
4. Check calibration of spreader frequently to ensure spreader is functioning properly and applying product evenly.

IMPORTANT: It is important to follow directions as indicated on this quality lawn care product as over-application may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed at which applied, and roughness of area treated. Be sure to calibrate spreader before beginning, adjusting if necessary. Consult Owners' Manual.

NEVER APPLY BY HAND.

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn.

SPREADER SETTINGS:
AJUSTES DEL ESPARCIDOR:

ROTARY SPREADERS	ESPARCIDORES ROTATIVOS
EARTHWAY 2050	12
SCOTTS SPEEDYGREEN 1000	7 1/4
SCOTTS SPEEDYGREEN 2000	7
SCOTTS SPEEDYGREEN 3000	7
VIGORO 4300	6
VIGORO 10,000	4
VIGORO 15,000	4
DROP SPREADERS	**ESPARCIDORES POR GOTEO**
SCOTTS ACCUGREEN 1000	6 3/4
SCOTTS ACCUGREEN 2000	7 1/2
SCOTTS ACCUGREEN 3000	8

Use siempre un esparcidor de fertilizante. Consulte la tabla de ajustes del esparcidor para ver las proporciones de los ajustes del esparcidor. **Riegue con abundante agua después de la aplicación.**

CÓMO APLICAR

1. Aplique este producto en la proporción: 3.4 lb por 1,000 pies cuadrados (1 bolsa trata 5,000 pies cuadrados).
2. Calibre el esparcidor de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Haga los ajustes necesarios para aplicar la proporción de producto recomendada.

3. Usando un esparcidor por goteo o rotativo, aplique gránulos de forma pareja sobre el césped, evitando excesos, superposiciones y zonas sin aplicar. Evite usar esparcidores que aplican el producto en bandas estrechas o concentradas.
4. Compruebe la calibración del esparcidor con frecuencia para asegurarse de que funcione correctamente y aplique el producto de forma pareja.

IMPORTANTE: Es importante seguir las instrucciones indicadas en este producto de calidad para el cuidado del césped, ya que una aplicación excesiva puede dañarlo.

Los ajustes del esparcidor son aproximados. Las diferencias pueden darse debido a la condición del esparcidor, la velocidad a la que se aplica el producto y la rugosidad de la superficie tratada. Asegúrese de calibrar el esparcidor antes de comenzar y ajústelo si es necesario. Consulte el Manual del Propietario.

NUNCA APLIQUE CON LA MANO.

Para evitar que queden huecos o excesos de aplicación, comience desde el borde del terreno y luego continúe hacia el centro con pasadas paralelas uniformes. Camine a un ritmo estable de modo que aplique el producto uniformemente sobre el césped.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store product in original container in a cool, dry, locked place out of reach of children and pets.
Disposal: If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Almacene el producto en el contenedor original en un lugar fresco, seco y cerrado fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Eliminación: Si está vacío: No vuelva a utilizar este envase. Colóquelo en un basurero u ofrézcalo para reciclaje si el servicio está disponible. **Si está lleno en parte:** Llame a la agencia de desechos sólidos de su zona o llame al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones acerca de cómo eliminar dichos desechos. Nunca coloque el producto que no se utilizó en un drenaje interior o exterior.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes eye irritation, if in eyes. Harmful if inhaled. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. If product gets on clothes, wash before reuse. Prolonged or repeated skin contact may cause allergic skin reactions in some individuals.

First Aid

This table below describes the first aid procedures for incidents involving this product.

In the case of accidental . . .	Immediately . . .
Contact with eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
Inhalation of dust	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a Poison Control Center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Environmental Hazards

- This product is toxic to fish and highly toxic to other aquatic organisms including oysters and shrimp. Use with care when applying to turf areas adjacent to any body of water. Drift and runoff from treated turf may adversely affect aquatic organisms in adjacent aquatic sites. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas.
- Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment washwater.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Peligros para Humanos y Animales Domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación ocular si penetra en los ojos. Peligroso si se inhala. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de su manipulación. Si el producto entra en contacto con la ropa, lávela antes de volver a usarla. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en la piel de algunas personas.

Primeros Auxilios

La tabla siguiente describe los procedimientos de primeros auxilios para incidentes que involucran a este producto.

En el caso de que accidentalmente se produzca...	Inmediatamente . . .
Contacto con los ojos	• Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto (si es que usa) después de los primeros 5 minutos, luego siga enjuagando los ojos. • Llame a un Centro de Toxicología o a un médico para que le prescriba un tratamiento.
Inhalación del polvo	• Lleve a la persona al aire fresco. • Si la persona no puede respirar, llame al 911 o a una ambulancia y luego, proporciónele respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. • Llame a un Centro de Toxicología o a un médico para que le prescriba un tratamiento adicional.

Tenga a mano el contenedor o la etiqueta del producto cuando llame al Centro de Toxicología o al médico, o busque tratamiento.

Peligros Ambientales

- Este producto es tóxico para los peces y altamente tóxico para otros organismos acuáticos como ostras y camarones. Úselo con cuidado al aplicar en áreas con césped adyacentes a cualquier masa de agua. La deriva o el desplazamiento pueden afectar en forma adversa a los organismos de sitios acuáticos adyacentes. No lo aplique directamente al agua o en áreas donde haya superficies de agua o en áreas entre mareas debajo de la marca máxima promedio. No lo aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan la deriva del área tratada.
- No contamine el agua cuando limpie el equipo o cuando elimine el agua usada para la limpieza de los equipos.

GUARANTEED ANALYSIS: **30-3-4**

Total Nitrogen (N)	30%
1.17% Ammoniacal Nitrogen	
28.83% Urea Nitrogen*	
Available Phosphate (P_2O_5)	3%
Soluble Potash (K_2O)	4%

Derived from: Polymer-coated Urea, Polymer-coated Sulfur-coated Urea, Urea, Diammonium Phosphate and Muriate of Potash.

*Contains 6.0% slowly available urea nitrogen from coated urea.

Distributed and guaranteed by Spectrum Group **F1074**
Division of United Industries Corporation, PO Box 142642
St. Louis, MO 63114-0642 11-7473 ©2005 UIC

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

If you use Vigoro Ultra Turf Pre-Emergent Crabgrass Control plus Fertilizer 30-3-4 as directed and are not completely satisfied, send proof of purchase from this package and the original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.

Ultra Turf® is a registered trademark of Martin Resources, Inc. and is used under license.

When applied as directed, this product meets the guidelines for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at **http://www.regulatory-info-sb.com.**

EPA Reg. No. 8860-154-8845
EPA Est. Nos. 9198-OH-1 (M), 9198-OH-2 (B), 9198-AL-1 (A), 49991-TX-1 (AZ), 49991-TX-2 (BC), 45065-MN-1 (BD), 59144-GA-1 (BE), 6665-NY-1 (BF), 35512-FL-2 (BG), 8378-IN-1 (AS), 43854-MO-1 (BH), 49710-TX-1 (AT), 49710-TX-3 (AU), 3234-UT-1 (AV), 3234-AZ-1 (AW), 8660-AL-1 (BN), 8660-OH-1 (BO), 74764-CA-1 (BK), 74764-FL-1 (BL), 9404-FL-1 (AX), 35497-OR-1 (AY)
Circled letter is first letter of lot number.

Visit Us On The Internet
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visítenos en Internet
Para Información en Español

vigoro.com or 1-800-561-1333

0 13013 22322 9